

## Feuille d'exercices n°13

### Exercice 1 $\not\Leftarrow$ : sur la divergence

Si  $f = (f_1, \dots, f_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , on rappelle que l'opérateur de divergence est défini par :

$$\operatorname{div} f = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f_i$$

Soit  $\phi^t$  le flot associé à une équation différentielle  $u' = f(t, u)$  sur  $\mathbb{R}^n$ , avec  $f : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$  de classe  $\mathcal{C}^2$ . On suppose que  $f$  vérifie :

$$\operatorname{div}_x f(t, x) = 0 \quad \forall t, x$$

Montrer alors que la différentielle du flot par rapport à  $x$  est de déterminant 1. (on pourra remarquer que l'application  $\psi : (t, x) \mapsto \phi^t(x)$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  et calculer de deux manières  $\partial_t d_x \psi$ .)

### Exercice 2 $\not\Leftarrow$ : équation de transport

Soit  $A(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que  $\|A\|_\infty < +\infty$ .

Soit  $f_0 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$ .

On considère l'équation aux dérivées partielles suivantes :

$$\begin{cases} \partial_t f + \langle A(t, x), \nabla_x f \rangle = 0 \\ f|_{t=0} = f_0 \end{cases}$$

où l'inconnue est une fonction  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .

1. Montrer que pour tout  $x$  il existe une unique fonction  $X_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  telle que

$$X'_x(t) = A(t, X_x(t))$$

et  $X_x(0) = x$ .

2. Supposons que  $f$  soit solution du problème. Que peut-on dire de  $g(t) := f(t, X_x(t))$  ?

3. On note  $\phi^t(x) = X_x(t)$  le flot de l'équation différentielle de la première question. Montrer que  $(t, x) \mapsto (t, \phi^t(x))$  est un difféomorphisme  $\mathcal{C}^1$  de  $\mathbb{R}^{n+1}$  dans lui-même.

4. En déduire que si  $f$  est solution,  $f(t, x) = f_0((\phi^t)^{-1}(x))$  et conclure.

5. Pourquoi cette équation s'appelle-t-elle « équation de transport » ?

### Exercice 3 $\not\Leftarrow$ : un peu d'équa diff

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soient  $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  deux applications continues. On considère l'équation suivante :

$$\dot{u} = A(t)u + b(t)$$

On suppose que  $A$  et  $b$  sont périodiques, de même période  $T$ . On va montrer que l'équation admet une solution périodique si et seulement si elle admet une solution bornée sur  $\mathbb{R}^+$ .

1. Remarquer le sens facile.
2. Montrer que la résolvante  $R_s^t$  de l'équation linéaire  $u'(t) = A(t)u(t)$  vérifie  $R_{s+T}^{t+T} = R_s^t$ . En déduire qu'il existe  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $y \in \mathbb{R}^n$  tels que si  $u$  est solution, pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ ,

$$u((k+1)T) = Mu(kT) + y$$

[Indication : utiliser la formule de Duhamel.]

3. Montrer qu'il existe  $x_0$  tel que  $x_0 = Mx_0 + y$ . (raisonner par l'absurde et prendre un projecteur sur  $\mathbb{R}y$  dont le noyau contient  $\text{Im}(I - M)$ ).
4. Conclure en considérant la solution de condition initiale  $x_0$ .

#### Exercice 4 $\neq \heartsuit$ : une étude de systèmes différentiels

Soit  $\lambda > 1$ . On considère le système suivant :

$$\begin{cases} \dot{x} = \lambda x - xe^{x^2+y^2} \\ \dot{y} = \lambda y - ye^{x^2+y^2} \end{cases}$$

1. Étudier l'existence, l'unicité et la régularité en  $(t, \lambda)$  des solutions maximales pour toute donnée initiale  $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$ . On notera  $I_{(x_0, y_0)}$  l'intervalle maximal correspondant.
2. Déterminer les solutions stationnaires (c'est-à-dire constantes en temps).
3. Transformer le système d'équations en passant aux coordonnées polaires  $(r, \theta)$  et déduire que les courbes intégrales sont des portions de droite.
4. Lorsque  $x_0^2 + y_0^2 < \ln \lambda$ , montrer que la solution est de norme strictement croissant et globale, c'est-à-dire  $I_{(x_0, y_0)} = \mathbb{R}$ .
5. Lorsque  $x_0^2 + y_0^2 > \ln \lambda$ , montrer qu'il y a explosion du côté des  $t$  négatifs uniquement, c'est-à-dire  $I_{(x_0, y_0)} = ]-T^*; +\infty[$ .  
[Indication : vérifier que, pour  $t \leq 0$ , il existe  $C > 0$  (dépendant de  $x_0^2 + y_0^2$ ) tel que  $\dot{r} \leq -Cr^2$ , où  $r = \|(x, y)\|$ ]
6. Quelles sont les valeurs limites possibles pour la norme lorsque  $t \rightarrow \pm\infty$ ? Déterminer ces limites dans les différents cas.
7. Tracer les courbes intégrales dans le plan  $(x, y)$ .

#### Exercice 5 $\neq \heartsuit$ : théorème de Hadamard

Ce théorème énonce que si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , alors il y a équivalence entre :

1.  $f$  est un difféomorphisme de  $\mathbb{R}^n$  sur lui-même.
2.  $f$  est propre et  $df(x)$  est de déterminant non nul pour tout  $x$  (c'est-à-dire inversible pour tout  $x$ ).

[On dit qu'une application est propre si l'image réciproque de tout compact est un compact.]

On veut démontrer l'équivalence précédente dans le cas où  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$ .

1. Montrer que (1) implique (2), puis que (2) implique que  $f$  est surjective (par un argument de connexité).
2. On suppose désormais que  $f$  vérifie (2). Soit  $z \in \mathbb{R}^n$  un vecteur fixé dans la suite de l'énoncé. Montrer que  $S = \{x \in \mathbb{R}^n, f(x) = f(z)\}$  est fini.

3. Montrer que les solutions du système différentiel

$$\begin{cases} \dot{x} = -(df(x))^{-1} \cdot (f(x) - f(z)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

sont bien définies sur  $[0, +\infty[$ . (On pourra astucieusement calculer la dérivée de  $t \mapsto f(x(t))$  et utiliser la propriété de  $f$ .)

4. Montrer que  $f$  est injective puis conclure.

### Exercice 6

Soit  $(E)$  l'équation  $x'(t) = f(x(t))$ , avec  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  lipschitzienne. Soit  $\Phi_t$  le flot associé. Pour tout  $x_0$ , on appelle *orbite* de  $x_0$  et on note  $\text{Orb}(x_0)$  l'ensemble des  $\Phi_t(x_0)$  pour  $t \in \mathbb{R}^+$ . On appelle ensemble  $\omega$ -limite de  $x_0$  l'ensemble :

$$\omega(x_0) = \bigcap_{t \geq 0} \overline{\{\Phi_s(x_0), s \geq t\}}$$

1. Montrer que si  $\text{Orb}(x_0)$  est bornée, alors  $\omega(x_0)$  est un compact non-vidé, connexe et invariant (c'est-à-dire  $\Phi_t(\omega(x_0)) = \omega(x_0)$  pour tout  $t$ ).

2. Montrer que si  $f$  est de la forme  $\nabla g$  pour une certaine fonction  $g$  de classe  $\mathcal{C}^1$ , alors  $\Phi_t$  n'a pas d'orbites périodiques autres que les solutions stationnaires.

3. On suppose qu'il existe une fonction de Lyapunov « stricte » pour le système  $(E)$ , c'est-à-dire une fonction  $\psi$  telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \langle \nabla \psi(x), f(x) \rangle < 0 \quad \text{sauf si } f(x) = 0$$

et, pour tout  $M$ , l'ensemble  $\{\psi(x) \leq M\}$  est compact.

a) Montrer que les solutions maximales de  $(E)$  sont définies sur des intervalles non-majorés.

b) Montrer que  $\psi$  est constante sur  $\omega(x_0)$ , pour tout  $x_0$ .

c) On suppose que les points où  $f$  s'annule sont isolés. Montrer que si  $\Phi_{t_n}(x_0)$  est une suite convergente (avec  $t_n \rightarrow +\infty$ ), alors elle converge vers un zéro de  $f$ .

d) Sous la même hypothèse qu'à la question c), montrer que toute trajectoire converge vers un zéro de  $f$ .

### Exercice 7 $\#\#\#$ : résolution d'une équation différentielle via le théorème d'inversion locale

Soit  $F = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$  muni de la norme de la convergence uniforme, et  $E$  le sous-espace fermé de  $\mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R})$  des fonctions qui s'annulent en 0 et 1, muni de la norme  $\|y\|_E = \|y''\|_\infty + \|y'\|_\infty + \|y\|_\infty$ . On se donne deux fonctions  $h$  et  $k$  réelles continues sur  $[0, 1]$ , et on considère l'application  $\phi : E \rightarrow F$  définie par  $\phi(y) = y'' + hy'^2 + ky^2$ .

1. Montrer que l'application  $\psi : E \times E \rightarrow F$  définie par  $\psi(y, z) = h \cdot y' \cdot z' + k \cdot y \cdot z$  est bilinéaire continue.

2. Montrer que  $\phi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $E$  et calculer la différentielle  $d\phi(0)$  de  $\phi$  en 0.

3. En déduire qu'il existe  $\epsilon > 0$  tel que, pour toute fonction  $f \in F$  vérifiant  $\|f\|_\infty < \epsilon$ , il existe  $y \in E$  tel que  $\phi(y) = f$ , c'est-à-dire une solution de l'équation différentielle  $y'' + h(x)y'^2 + k(x)y^2 = f(x)$  qui s'annule en 0 et en 1.

### Exercice 8 $\#\#\#\#$ : théorème de Poincaré-Bendixson

Soit  $U \subset \mathbb{R}^2$  un ouvert borné. Soit  $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^2)$  un champ de vecteurs. On considère l'équation différentielle suivante :

$$X'(t) = f(X(t)) \quad (\star)$$

On suppose que toutes les solutions maximales de ce système sont définies sur  $\mathbb{R}$  tout entier.

Pour tout  $x_0 \in U$  et tout  $s \in \mathbb{R}$ , on pose  $\phi_s(x_0) = X_{x_0}(s)$ , où  $X_{x_0}$  est la solution de  $(\star)$  telle que  $X_{x_0}(0) = x_0$ . On appelle  $\phi$  le *flot* associé à  $(\star)$ .

Pour tout  $x \in U$ , on appelle *ensemble limite de  $x$*  l'ensemble suivant :

$$\omega(x) = \bigcap_{s \geq 0} \overline{\{\phi_t(x) \mid t \geq s\}}$$

[C'est l'ensemble des points d'adhérence de la solution  $X$  de  $(\star)$  avec condition initiale  $x$ .]

1. Soit  $x \in U$ . On suppose qu'il existe  $D \subset U$  un compact tel que  $\phi_s(x) \in D$  pour tout  $s \geq 0$ .

Montrer que  $\omega(x)$  est un compact connexe non-vide stable par  $\phi_s$ .

Le but de l'exercice est de montrer une version simplifiée du théorème de Poincaré-Bendixson :

Si  $\omega(x)$  ne contient pas de point où  $f$  s'annule, alors il existe une solution périodique  $X$  de  $(\star)$  telle que  $\omega(x) = \{X(s), s \in \mathbb{R}\}$ .

2. [Théorème de redressement du flot] Soit  $x_0 \in U$  un point tel que  $f(x_0) \neq 0$ . Soit  $D$  une droite passant par  $x_0$ , de vecteur directeur  $\vec{u}$ , telle que  $f(x_0)$  n'est pas colinéaire à  $\vec{u}$ .

Montrer qu'il existe  $V \subset U$  un voisinage de  $x_0$ ,  $\epsilon_1, \epsilon_2 > 0$  et  $\psi : V \rightarrow ]-\epsilon_1; \epsilon_1[ \times ]-\epsilon_2; \epsilon_2[$  un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme tels que :

1.  $\psi(x_0) = (0, 0)$
2.  $\psi^{-1}(] - \epsilon_1; \epsilon_1[ \times \{0\}) \subset D$
3. Si  $X$  est une solution maximale de l'équation  $(\star)$  restreinte à  $V$ , alors  $\psi(X)$  est une fonction de la forme  $t \in ]t_0 - \epsilon_2; t_0 + \epsilon_2[ \rightarrow (a, t - t_0)$ , pour certaines constantes  $a \in ]-\epsilon_1; \epsilon_1[, t_0 \in \mathbb{R}$ .

L'ensemble  $I = \psi^{-1}(] - \epsilon_1; \epsilon_1[ \times \{0\}) \subset V \cap D$  (qui est un intervalle ouvert de  $D$ ) est appelé *section transverse*.

On admet que l'ensemble des points d'intersection entre une section transverse  $I$  et l'image d'une solution maximale  $X$  de  $(\star)$ , définie sur  $\mathbb{R}$ , est toujours de l'une des trois formes suivantes :

- l'ensemble vide
- un singleton
- un ensemble dénombrable (fini ou infini); dans ce cas, si on note  $\{t_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  les réels tels que  $X(t_k) \in I$ , les points  $X(t_k)$  sont disposés sur  $I$  dans le même ordre que les réels  $\{t_k\}$  sont ordonnés dans  $\mathbb{R}$ , c'est-à-dire que le point  $X(t_k)$  est « entre » les points  $X(t_l)$  et  $X(t_m)$  si et seulement si  $t_k$  appartient à l'intervalle  $]t_l; t_m[$  (ou  $]t_m; t_l[$  si  $t_m < t_l$ ).

[À l'aide du théorème de Jordan, la démonstration de ce résultat n'est pas très difficile mais tout de même assez technique.]

3. Montrer que si  $I$  est une section transverse,  $\omega(x)$  a au plus un point d'intersection avec  $I$ .

4. Soit  $x$  comme dans la question 1. On suppose que  $f$  ne s'annule pas sur  $\omega(x)$ .

Soit  $y \in \omega(x)$  quelconque. Soit  $X$  la solution de  $(\star)$  pour la condition initiale  $X(0) = y$ .

a) Montrer que  $X(\mathbb{R}^+) \subset \omega(x)$  et que  $\omega(y) \subset \omega(x)$ .

b) Montrer que  $X$  est périodique.

[Indication : considérer un point  $z \in \omega(y)$  et une section transverse passant par  $z$ .]

5. Montrer que  $\{X(s), s \in \mathbb{R}\}$  est ouvert et fermé dans  $\omega(x)$  puis conclure.