

Correction du Td n° 5 d'Analyse fonctionnelle

TRANSFORMATION DE FOURIER

Séance du 14 mars 2014

Solution 1. *Quelques questions sur la transformée de Fourier*

1. $\mathbb{1}_A \in L^2$ donc $\widehat{\mathbb{1}_A} \in L^2$ par Plancherel. Par contre, si $\widehat{\mathbb{1}_A} \in L^1$, par inversion de Fourier, on aurait que $\mathbb{1}_A \in C$, ce qui est absurde.

2. La condition s'écrit en Fourier : $\hat{f}\hat{g} = 0$. Il suffit donc de prendre $f_1, g_1 \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ avec $\text{Supp}(f_1)$ et $\text{Supp}(g_1)$ et de poser $f = \mathcal{F}^{-1}f_1$, $g = \mathcal{F}^{-1}g_1$ (et ce sont bien des éléments de $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$).

Si on suppose de plus que les supports de f et g sont compacts, alors \hat{f} et \hat{g} sont analytiques. Comme les zéros de \hat{f} et de \hat{g} sont alors isolés (sauf si f ou g est nul), ceux de $\hat{f}\hat{g}$ le sont également et $\hat{f}\hat{g} \neq 0$. Par inversion de Fourier, on voit que $f * g \neq 0$.

3. En Fourier, on a $\sum_{i=1}^k a_i \xi^i \hat{u}(\xi) = 0$. Or \hat{u} est analytique (pourquoi?) donc par le principe des zéros isolés, $\hat{u} = 0$ et donc $u = 0$.

★

Solution 2. *Transformée de Fourier de $\text{vp}x$*

1. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle x \text{vp} x, \varphi \rangle = \langle \text{vp} x, x\varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle .$$

Donc $x \text{vp} x \equiv 1$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

2. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on a par définition de la transformée de Fourier des distributions :

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}(\text{vp} x), \varphi^v \rangle &= \langle \text{vp} x, \mathcal{F}(\varphi^v) \rangle \\ &= \langle \text{vp} x, (\mathcal{F}(\varphi))^v \rangle \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\mathcal{F}(\varphi)(-\xi)}{\xi} d\xi + \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\mathcal{F}(\varphi)(-\xi)}{\xi} d\xi \\ &= - \langle \text{vp} x, \mathcal{F}(\varphi) \rangle . \end{aligned}$$

3. D'après la question 1, on a, comme $\mathcal{F}(1) = 2\pi\delta_0$:

$$2\pi\delta_0 = \mathcal{F}(x \text{vp} x) = i\mathcal{F}(\text{vp} x)' ,$$

donc $\mathcal{F}(\text{vp} x)' = -2i\pi\delta_0$; on en déduit que $\mathcal{F}(\text{vp} x) = -2i\pi(H + C)$, où H est la fonction de Heavyside et C est une constante. L'imparité donne $C = -1/2$; D'où :

$$\mathcal{F}(\text{vp} x)(\xi) = -i\pi \frac{\xi}{|\xi|} .$$

★

Solution 3. *Théorème de Paley-Wiener*

1. Si T est une distribution à support compact, on peut écrire $\mathcal{F}(T)(\xi) = \langle T, e^{-ix\xi} \rangle$. $\mathcal{F}(T)$ est donc analytique.

2. Soit T est une distribution à support compact, on note p son ordre.

$$|\mathcal{F}(T)(\xi)| = |\langle T, e^{-ix\xi} \rangle| \leq C \sum_{k=1}^p \|\partial^k e^{-ix\xi}\| \leq C(1 + |\xi|^p).$$

Réciproquement, soit F , analytique, satisfait une telle condition. Alors $F \in \mathcal{S}'$. Soit $\rho_k(x) = k\rho(kx)$ une approximation de l'unité. Comme ρ_k est à support compact, $\widehat{\rho}_k$ satisfait les conditions du théorème de Paley-Wigner, donc $\widehat{\rho}_k F$ aussi, donc $\rho_k * \mathcal{F}^{-1}(F)$ est C^∞ à support dans $B(0, R + \frac{1}{k})$. Soit $g \in \mathcal{D}(c\bar{B}(0, R))$. On a alors, pour k assez grand

$$0 = \langle \rho_k * \mathcal{F}^{-1}(F), g \rangle = \langle \mathcal{F}^{-1}(F), \rho_k * g \rangle \longrightarrow \langle \mathcal{F}^{-1}(F), g \rangle$$

donc $\mathcal{F}^{-1}(F)$ est à support dans $B(0, R)$.

★

Solution 4. *L'équation de Schrödinger*

1. On prend la transformée de Fourier par rapport à x de l'équation.

$$i\partial_t \widehat{u} - |\xi|^2 \widehat{u} = 0,$$

donc on obtient $\widehat{u} = e^{it|\xi|^2} \widehat{u}_0$. Comme la transformée de Fourier est un isométrie de L^2 dans lui même, on obtient

$$\|u(t)\|_{L^2} = \|u_0\|_{L^2}.$$

2. $e^{it|\xi|^2}$ est borné, donc est dans \mathcal{S}' et sa transformée de Fourier est bien définie (au sens de \mathcal{S}').

3. On montre que pour α de partie réelle strictement négative, on a

$$\nabla \mathcal{F}^{-1}(e^{\alpha|\xi|^2}) = \frac{x}{2\alpha} \mathcal{F}^{-1}(e^{\alpha|\xi|^2}),$$

donc $\mathcal{F}^{-1}(e^{\alpha|\xi|^2}) = \mathcal{F}^{-1}(e^{\alpha|\xi|^2})(0) e^{\frac{|x|^2}{4\alpha}}$ On calcule ensuite

$$\mathcal{F}^{-1}(e^{\alpha|\xi|^2})(0) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int e^{\alpha|\xi|^2} d\xi = \frac{1}{(2\pi)^n} \left(\frac{\pi}{-\alpha} \right)^{\frac{n}{2}}.$$

4. Soit $\phi \in \mathcal{S}$. On écrit

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{(-i4\pi bt)^{\frac{n}{2}}} e^{\frac{|x|^2}{-i4b}}, \phi \right\rangle &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\langle \frac{1}{(4\pi(\varepsilon - ibt))^{\frac{n}{2}}} e^{\frac{|x|^2}{4(-\varepsilon + ib)}}, \phi \right\rangle \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\langle \mathcal{F}^{-1}(e^{(-\varepsilon + ib)|\xi|^2}), \phi \right\rangle \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\langle e^{(-\varepsilon + ib)|\xi|^2}, \mathcal{F}^{-1}(\phi) \right\rangle \\ &= \left\langle e^{ib|\xi|^2}, \mathcal{F}^{-1}(\phi) \right\rangle \\ &= \left\langle \mathcal{F}^{-1}(e^{ib|\xi|^2}), \phi \right\rangle \end{aligned}$$

5. Si $u(t)$ est solution de l'équation de Schrödinger, alors $u(t) = \mathcal{F}^{-1}(e^{it|\xi|^2} * u_0)$, donc pour $t > 0$ on a

$$\|u(t)\|_{L^\infty} \leq \|\mathcal{F}^{-1}(e^{it|\xi|^2})\|_{L^\infty} \|u_0\|_{L^1} \leq \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \|u_0\|_{L^1}.$$

★